


Computergrafik SS 2016

Oliver Vornberger


Kapitel 3: 2D-Grundlagen

Punkt, Punkt, Komma, Strich, ...




... fertig ist das Mondgesicht !

Koordinatensysteme



Punkt + Vektor



$$P(3, 4)$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = (3, 4)^T$$

$$e_x = (1, 0)^T$$

$$e_y = (0, 1)^T$$


$$\vec{p} = 3 \cdot e_x + 4 \cdot e_y$$

setPixel(int x, int y)


```
setPixel(3,4);
```

```
setPixel((int)(x+0.5),(int)(y+0.5));
```

Linie



Parametrisierte Gradengleichung



$$g : \vec{u} = \vec{p}_1 + r \cdot \vec{v}; \quad r \in \mathbb{R}$$

$$l : \vec{u} = \vec{p}_1 + r \cdot \vec{v}; \quad r \in [0; 1]$$

1.0000

$$P = (1 - t) \cdot P_1 + t \cdot P_2$$

$$d = \|\overline{P_1 P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$step = \frac{1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$

VectorLine

```
int x1,y1,x2,y2,x,y,dx,dy;
double r, step;

dy = y2-y1;
dx = x2-x1;

step = 1.0/Math.sqrt(dx*dx+dy*dy);
for (r=0.0; r <= 1; r=r+step) {
    x = (int)(x1+r*dx+0.5);
    y = (int)(y1+r*dy+0.5);
    setPixel(x,y);
}
```


Gradengleichung als Funktion


$$y = f(x) = s \cdot x + c$$

$$s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y_1 - c}{x_1 - 0} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$c = \frac{y_1 \cdot x_2 - y_2 \cdot x_1}{x_2 - x_1}$$

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x + \frac{x_2 \cdot y_1 - x_1 \cdot y_2}{x_2 - x_1}$$




StraightLine

von links nach rechts

```
s = (double)(y2-y1)/(double)(x2-x1);  
c = (double)(x2*y1-x1*y2)/(double)(x2-x1);  
  
for (x=x1; x <= x2; x++) {  
    y = (int)(s*x+c+0.5);  
    setPixel(x,y);  
}
```

Oktanden


1.



Bresenham

Steigung $s = \Delta y / \Delta x = 3/10 = 0.3$

Fehler $error = y_{ideal} - y_{real}$



BresenhamLine, die 1.

```
dy = y2-y1; dx = x2-x1;
s = (double)dy/(double)dx;
error = 0.0;
x = x1;
y = y1;
while (x <= x2){
    setPixel(x,y);
    x++;
    error = error + s;
    if (error > 0.5) {
        y++;
        error = error - 1.0;
    }
}
```

BresenhamLine


alle 8 Oktanten durch Fallunterscheidung abhandeln:

~cg/2016/skript/Sources/drawBresenhamLine.jav.html

Java-Applet:

~cg/2016/skript/Applets/2D-basic/App.html

Antialiasing



Antialiasing in Adobe Photoshop



abc
abc

BresenhamLine, die 2.

```
dy = y2-y1; dx = x2-x1;
s = (double)dy/(double)dx; delta = 2*dy
error = 0.0;
x = x1;
y = y1;
while (x <= x2){
    setPixel(x,y);
    x++;
    error = error + s; delta
    if (error > 0.5) { dx
        y++;
        error = error - 1.0; 2*dx
    }
}
```

multipliziere Steigung mit 2dx

BresenhamLine, die 3.

```
dy = y2-y1; dx = x2-x1;
s = (double)dy/(double)dx; delta = 2*dy
error = 0.0; -dx
x = x1; schritt = -2*dx
y = y1;
while (x <= x2){
    setPixel(x,y);
    x++;
    error = error + s; delta
    if (error > 0.5) {
        y++;
        error = error -1.0; -dx
    }
}
```

Verschiebe error um dx nach unten. Führe Variable **schritt** ein

Punkt versus Gerade

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 7-2 \\ 5-3 \end{pmatrix} \quad \vec{u} = \vec{p}_1 + r \cdot \vec{v}$$

$$x = 2 + 5r$$

$$y = 3 + 2r$$

$$2x = 4 + 10r$$

$$5y = 15 + 10r$$

$$-2x + 5y = 11$$

$$-2x + 5y - 11 = 0$$

$$F(x,y) = 0 \text{ falls } P \text{ auf der Geraden}$$


$$> 0 \text{ falls } P \text{ links von der Geraden}$$

$$< 0 \text{ falls } P \text{ rechts von der Geraden}$$


$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} - 11 = 0$$

Skalarprodukt


Was hat dieser Vektor mit der ursprünglichen Gerade zu tun ?



Polygon




konvex



konkav

Konvexitätstest nach Paul Bourke




Kreis um (0,0), parametrisiert

$$x = r \cdot \cos(\alpha)$$

$$y = r \cdot \sin(\alpha)$$

$$u = 2 \cdot \pi \cdot r$$


$$step = \frac{2 \cdot \pi}{2 \cdot \pi \cdot r} = 1/r$$



TriCalcCircle

```
double step = 1.0/(double r);  
double winkel;  
  
for (winkel = 0.0;  
     winkel < 2*Math.PI;  
     winkel = winkel+step){  
  
    setPixel((int) r*Math.cos(winkel)+0.5,  
            (int) r*Math.sin(winkel)+0.5);  
}
```

Punkt versus Kreis



$$x^2 + y^2 = r^2$$


$$F(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$$

$F(x, y) = 0$ für (x, y) auf dem Kreis


< 0 für (x, y) innerhalb des Kreises

> 0 für (x, y) außerhalb des Kreises

Kreis im 2. Oktanten



Entscheidungsvariable Δ



$$\Delta = F(x+1, y-1/2)$$

$\Delta < 0 \Rightarrow M$ liegt innerhalb \Rightarrow wähle $(x+1, y)$

$\Delta \geq 0 \Rightarrow M$ liegt außerhalb \Rightarrow wähle $(x+1, y-1)$

Berechnung von Δ

$$\Delta = F(x+1, y-\frac{1}{2}) = (x+1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 - r^2$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow$$

$$\Delta' = F(x+2, y-\frac{1}{2}) = (x+2)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 - r^2 =$$

$$\Delta + 2x + 3$$

$$\Delta \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Delta' = F(x+2, y-\frac{3}{2}) = (x+2)^2 + (y-\frac{3}{2})^2 - r^2 =$$

$$\Delta + 2x - 2y + 5$$

$$\text{Startwert } \Delta = F(1, r-\frac{1}{2}) = 1^2 + (r-\frac{1}{2})^2 - r^2 =$$

$$5/4 - r$$

BresenhamCircle, die 1.


```
x = 0;
y = r;
delta = 5.0/4.0 - r;
while (y >= x) {
    setPixel(x,y);
    if (delta < 0.0) {
        delta = delta + 2*x + 3.0;
        x++;
    }
    else {
        delta = delta + 2*x - 2*y + 5.0;
        x++;
        y--;
    }
}
```

BresenhamCircle, die 2.

```
x = 0;
y = r;
delta = 5.0/4.0 - r;
while (y >= x) {
    setPixel(x,y);
    if (delta < 0.0) {
        delta = delta + 2*x + 3.0;
        x++;
    } else {
        delta = delta + 2*x - 2*y + 5.0;
        x++;
        y--;
    }
}
d:=delta-1/4    dx:=2x+3    dxy:= 2x-2y+5
```

```
d = 1 - r;
dx = 3;
dxy = -2*r + 5;
(d <= 0.0)
d = d + dx;
dx = dx + 2;
dxy = dxy + 2;
d = d + dxy;
dx = dx + 2;
dxy = dxy + 4;
```

Oktanden-Symmetrie



BresenhamCircle, die 3.

```
x=0; y=r; d=1-r; x=3; dx=3; dxy=-2*r+5;
while (y>=x){
    setPixel(+x,+y);
    setPixel(+y,+x);
    setPixel(+y,-x);
    setPixel(+x,-y);
    setPixel(-x,-y);
    setPixel(-y,-x);
    setPixel(-y,+x);
    setPixel(-x,+y);

    if (d<0) {d=d+dx; dx=dx+2; dxy=dxy+2; x++;}
    else     {d=d+dxy; dx=dx+2; dxy=dxy+4; x++;
              y--;}
}
```

Source: ~cg/2016/skript/Sources/drawBresenhamCircle.jav

Java-Applet: ~cg/2016/skript/Applets/2D-basic/App.html


Ellipse um (0,0)

$$(e + x)^2 + y^2 = a_1^2$$

$$(e - x)^2 + y^2 = a_2^2$$



$$b = \sqrt{a^2 - e^2}$$



$$a = 5$$

$$b = 3$$

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$


$$y = \sqrt{\frac{225 - 9x^2}{25}}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$U \approx 2\pi \sqrt{\frac{1}{2}(a^2 + b^2)}$$

$$A = \pi ab$$


Ellipse um (0,0)
parametrisiert




$$x = a \cdot \cos(\alpha)$$

$$y = b \cdot \sin(\alpha)$$

Reflektion




1. Keplersches Gesetz




Die Planeten umkreisen die Sonne auf einer Ellipse

2. Keplersches Gesetz



In gleichen Zeiten überstreicht der Fahrstrahl gleiche Flächen


3. Keplersches Gesetz




Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der großen Halbachsen

Kegelschnitt: Kreis

Abstand zu einem Punkt ist konstant




$$x^2 + y^2 = 1$$




Kegelschnitt: Ellipse

Summe der Abstände zu 2 Punkten
ist konstant





$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Kegelschnitt: Parabel



Abstand zu Punkt und Gerade
ist gleich

$$y = ax^2 + bx + c$$



Kegelschnitt: Hyperbel

Differenz der Abstände zu 2 Punkten
ist konstant



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$